


Les vaccins obligatoires

11 vaccins sont obligatoires chez les nourrissons nés après le 1^{er} janvier 2018. Trois vaccins restent obligatoires chez les enfants nés avant cette date.

Les vaccins obligatoires et recommandés en fonction de l'âge



Légende

- Vaccins obligatoires
- Vaccins recommandés

*Obligatoire pour les personnes nées après le 1^{er} Janvier 2018

Les vaccins obligatoires : origines, symptômes, obligations médicales



La vaccination contre la diphtérie

La diphtérie est une infection causée par une bactérie très contagieuse. Elle se développe dans la gorge et produit une substance appelée « toxine ». Elle se manifeste habituellement par une angine à « fausses membranes », appelée ainsi à cause d'un enduit blanc qui recouvre les amygdales.

Le vaccin contre la diphtérie est obligatoire pour tous les nourrissons qu'ils soient nés avant ou après 2018. Elle repose sur :

- Deux injections chez le nourrisson : une à l'âge de 2 mois et l'autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois

Les rappels recommandés :

- A l'âge de 6ans, puis entre 11 et 13 ans
- Chez l'adulte à 25ans, 45ans, 65ans ; puis tous les 10 ans

La vaccination contre le tétanos

Le tétanos est causé par une toxine produite par une bactérie. Cette toxine entraîne des contractures musculaires intenses qui peuvent atteindre les muscles respiratoires. La maladie n'est pas contagieuse, mais elle est grave et souvent mortelle.

Le tétanos se contracte habituellement par des plaies, surtout lors de contact avec la terre. Le vaccin contre le tétanos est obligatoire pour tous les nourrissons, qu'ils soient nés avant ou après le 1^{er} janvier 2018. Elle repose sur :

- Deux injections chez le nourrisson : une à 2 mois et l'autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois

Les rappels recommandés :

- A l'âge de 6 ans, puis entre 11 et 13ans
- Chez l'adulte à 25ans, 45ans, et 65ans ; puis tous les 10 ans.

Les vaccins obligatoires : origines, symptômes, obligations médicales

+ La vaccination contre la poliomyélite

La poliomyélite est une infection due à un virus qui provoque des paralysies en attaquant le système nerveux. La contamination se fait principalement par voie digestive, lors de la consommation d'eau contaminée, d'aliments souillés ou par les mains sales.

Le vaccin contre la poliomyélite est obligatoire pour tous les nourrissons qu'ils soient nés avant ou après 2018. Elle repose sur :

- Deux injections chez le nourrisson : une à l'âge de 2 mois et l'autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois

Les rappels recommandés :

- A l'âge de 6ans, puis entre 11 et 13 ans
- Chez l'adulte à 25ans, 45ans, 65ans ; puis tous les 10 ans

+ La vaccination contre la coqueluche

La coqueluche est une maladie infectieuse respiratoire très contagieuse causée par une bactérie. La contamination se fait par l'air et par contact avec une personne qui a la coqueluche. Le symptôme principal de la coqueluche est la quinte de toux. Il existe des risques de complication, surtout chez le nourrisson de moins de 6 mois.

Le vaccin contre la coqueluche est obligatoire pour tous les nourrissons nés à partir du 1^{er} Janvier 2018 et recommandés pour ceux nés avant cette date avec :

- Deux injections chez le nourrisson : une à l'âge de 2 mois et l'autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois

Les rappels recommandés :

- A l'âge de 6ans, puis entre 11 et 13 ans

A SAVOIR : La vaccination contre la coqueluche est également recommandée pour les adultes ayant un projet parental, au cours de la grossesse ou juste après l'accouchement pour la mère et les autres personnes susceptibles d'être en contact étroit avec le nourrisson au cours de ses 6 premiers mois.

Et aussi pour les professionnels soignants (et étudiants), les professionnels de la petite enfance et les assistants maternels et baby-sitters.

Les vaccins obligatoires : origines, symptômes, obligations médicales

+ La vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)

La rougeole, les oreillons et la rubéole sont trois infections très contagieuses dues à des virus.

La vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis le 1^{er} Janvier 2018. Elle est effectuée par :

- Deux injections chez le nourrisson : une à l'âge de 12 mois et l'autre entre 16 et 18 mois

Pour les personnes nés depuis 1980 et âgées de plus de 18 mois, le rattrapage vaccinal nécessite deux doses au total à un moins d'intervalle minimum.

A SAVOIR !

Rougeole : Lorsqu'une personne n'a pas reçu 2 doses de vaccins et se trouve en contact avec une personne malade, il est recommandé de lui administrer une dose de vaccin dans les 72h.

Oreillons : Si des cas surviennent dans une collectivité, il est recommandé de mettre à jour le statut vaccinal et proposer une 3^{ème} dose de vaccin aux personnes vaccinées depuis plus de 10ans.

+ La vaccination contre l'Haemophilus influenza de type B

L'Haemophilus influenza de type B est responsable de pneumonies et de méningites. Elle est présente dans le nez et la gorge. La contamination se fait de personne à personne. Le risque d'infection grave existe surtout chez le jeune enfant.

La vaccination contre l'haemophilus influenza est obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis le 1^{er} Janvier 2018. Elle est effectuée par :

- Deux injections chez le nourrisson : une à l'âge de 2 mois et l'autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois

Un rattrapage peut être effectué jusqu'à l'âge de 5ans.

Les vaccins obligatoires : origines, symptômes, obligations médicales



+ La vaccination contre l'hépatite B

L'hépatite B est une maladie virale du foie, qui peut devenir chronique. Les principales causes de transmission du virus de l'hépatite B sont les relations sexuelles et le contact avec du sang contaminé.

La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis le 1^{er} Janvier 2018.

Lorsque les parents souhaitent que cette vaccination soit faite en même temps que les autres vaccins, un vaccin combiné peut être utilisé pour : diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, haemophilus influenza et hépatite B. Réalisée par :

- Des injections chez le nourrisson : à l'âge de 2 mois, 4 mois et 11 mois

Un rattrapage devrait être proposé à tout les enfant ou adolescent âgé de moins de 16 ans qui n'aurait pas été vacciné antérieurement.

A SAVOIR !

Certaines personnes courent un risque plus important et il est particulièrement recommandé de les protéger, notamment :

- Les nouveau-nés de mère porteuse de l'hépatite B ou nés en Guyane ou à Mayotte, les enfants et adolescents accueillis en collectivité, les personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples, les personnes séropositives pour le VIH, hépatite C ou infection sexuellement transmise, les personnes adeptes du tatouage ou du piercing, les toxicomanes, les personnes susceptibles d'être transfusées, l'entourage proche d'une personne infectée, les partenaires sexuels d'une personne infectée, les personnes accueillies dans les institutions psychiatriques, les détenues, les voyageurs, les professionnels en contact direct avec des patients ou exposés au sang et autres produits biologiques.

Les vaccins obligatoires : origines, symptômes, obligations médicales

+ La vaccination contre le pneumocoque

Le pneumocoque est une bactérie. Il entraîne des infections du poumon qui sont mal tolérées par les personnes fragiles. Il peut aussi être responsable d'otites et de méningites, notamment chez les jeunes enfants. La contamination se fait de personne à personne.

La vaccination contre le pneumocoque est obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis le 1^{er} Janvier 2018 par :

- Deux injections à l'âge de 2 mois et de 4 mois
- Un rappel à l'âge de 11 mois

Après l'âge de 2 ans, la vaccination contre le pneumocoque n'est recommandée que pour les personnes présentant une immunodépression ou une maladie favorisant la survenue d'une infection à pneumocoque.

+ La vaccination contre le méningocoque de type C

Le méningocoque est une bactérie présente dans la gorge et le nez. Le plus souvent il n'entraîne pas de maladie, mais parfois il est responsable d'infections graves comme des méningites chez les enfants et les jeunes adultes.

La vaccination contre le méningocoque est obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis le 1^{er} Janvier 2018 selon le schéma suivant :

- Pour les nourrissons, 1 dose de vaccin à 5 mois, puis une dose de rappel à 12 mois
- A partir de 12 mois et jusqu'à 24 ans révolus pour ceux n'ayant pas reçu de primovaccination antérieure.

A SAVOIR !

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les résidents de Guyane française.



A SAVOIR !

En milieu professionnel, selon l'activité exercée, certaines vaccinations sont obligatoires.